

关于毛枝榆学名的订正

黄普华 高仿优 卓丽环

A CRITICAL NOTE ON THE SCIENTIFIC NAME
OF THE HAIRYSHOOT ELM

Huang Pu-hwa Gao Fang-you Zhuo Li-huan

〔提要〕 产于喜马拉雅山区和云南的 *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. 与产于四川西南部的 *Ulmus wilsoniana* Schneid. var. *subhirsuta* Schneid., 形态十分酷似。傅立国先生研究后将其归并是合适的。本变种主要特征为小枝密被柔毛, 果核部分常呈淡红色, 红色或淡紫色。然而 *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. 的组合是基于一个晚出同名 (*Ulmus virgata* Planch. 1848, non Roxb. 1832), 是一个不合法的名称, 故毛枝榆采用现在组合名, 即: *Ulmus androssowii* Litw. var. *subhirsuta* (Schneid.) P. H. Huang, F. Y. Gao et L. H. Zhuo

毛枝榆

Ulmus androssowii Litw. var. *subhirsuta* (Schneid.) P. H. Huang, F. Y. Gao et L. H. Zhuo, comb. nov. — *Ulmus wilsoniana* Schneid. var. *subhirsuta* Schneid. in Sarg. Pl. Wilson. 3: 257. 1916. — *U. pumila* Linn. var. *pilosa* Rehd. in Journ. Arn. Arb. 1: 141. 1919. — *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. in Nov. System. Pl. Vascul. 8: 132. 1971; Fu Li-kuo, in Journ. N.-E. Forestry Inst. no. 3, 19. 1980. — *U. virgata* Wall. ex Planch. in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 10: 272. 1848. non Roxb. 1832.

本变种产我国西藏南部、四川西南及南部、云南昆明以西和以北地区, 辽宁熊岳有栽培; 印度、尼泊尔也有分布。

黄普华、卓丽环: 黑龙江, 哈尔滨, 东北林业大学 (Northeast Forestry University, Harbin, Heilongjiang 150040).
高仿优: 北京, 北京农学院 (Beijing Agricultural College, Beijing 100080).

本变种的主要特征为小枝密被柔毛、果核部分常呈淡红色、红色或紫红色，极易识别。

1971年，I. Grudzinskaya将采自喜马拉雅山区和云南的标本鉴定为 *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. 据傅立国先生研究，认为我国西藏南部、四川西南部、云南昆明以西和以北地区所采的标本应属于本变种。因此，他将1916年 C. K. Schneider，依据采自四川西昌的标本所建立的 *Ulmus wilsoniana* Schneid. var. *subhirsuta* Schneid. 归并入本变种(东北林学院学报第3期，19. 1980)。经研究，我们认为是合适的。然而，本变种的学名不能采用 *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. 原因是1971年Grudzinskaya所组合依据的基原异名 *Ulmus virgata* Wall. ex Planch. 是个晚出同名。按照国际植物命名法规第64条1款晚出同名必须废弃的规定，Grudzinskaya的组合是不合法的，不能采用。又根据法规第60条1款“当属或属之下的分类单位的等级被更改时，其正确的名称或加词，是用于那个新等级中一个最早的、合法的，可用的名称或加词。名称或加词倘若越出其本身的等级之外，就绝无优先律而言”的规定，我们认为毛枝榆的合法学名应重新组合为 *Ulmus androssowii* Litw. var. *subhirsuta* (Schneid.) P. H. Huang, F. Y. Gao et L. H. Zhuo因为在变种这一等级上，加词“*subhirsuta*”是一个最早的，合法的，可利用的加词。

ABSTRACT

The *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. from mountainous regions of Himalaya and Yunnan, and the *Ulmus wilsoniana* Schneid. var. *subhirsuta* Schneid. from south-western Sichuan are very similar. There seem to be no valid character which separate the two. Therefore, the reduction of *Ulmus wilsoniana* Schneid. var. *subhirsuta* Schneid. to *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. is reasonable by taxonomists. This variety is easily to be distinguished from type in its densely pubescent branchlets and reddish, red or purplish-red nutlets. However, the *Ulmus androssowii* Litw. var. *virgata* (Planch.) Grudz. based on later homonym (*Ulmus virgata* Planch. 1848 non Roxb. 1832) is an illegitimate name, so the present combination.